

日付	術前	術後	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目
	／		／	／	／	／
到達目標	絶飲食の指示を守ることができる 不安があれば訴えることができる	呼吸苦や傷部の出血や発赤等 異常があれば知らせることができる	歩行ができる、食事が摂れる 傷部に異常があれば 知らせることができる	入院前と同じように過ごすことができる 傷部に異常があれば知らせることができる		
点滴	点滴を始めます 	点滴があります	点滴があります			
			食事摂取量が少なければ追加の点滴 があります			
内服	お薬は中止です		痛みがあれば、声をおかけください。痛み止めがあります 持参薬を再開します。抗血栓薬服用の方は、医師確認後に再開日をお知らせします 			
処置		酸素マスクを装着します 指示に応じて酸素は中止となります		傷部を確認します 	ドレーン(お腹の管)がある場合は 抜きます	
検査			血液検査と レントゲンがあります 		血液検査をします 	
検温	手術前に測ります 	手術後30分、1時間後、2時間後、 以降4時間ごとに測ります	3回測ります 			
安静	自由です	痛みに応じて動けます				
清潔	手術までに爪を切り、 化粧は落としてください		洗面、歯磨きをお手伝いします 身体を拭きます	シャワー浴ができます 		
排泄	尿の回数をお聞きします	尿の管を手術室で入れます	朝、尿の管を抜きます 尿の回数をお聞きします	尿の回数をお聞きします 		
食事	絶飲食です 	お腹の動きを確認後、 術後4時間後から水分を 摂ることができます	朝は絶食、昼から食事がでます	食事がでます 		
リハビリ			必要に応じて介入します			
その他		手術後の説明があります	薬剤師から お薬の説明があります 			退院後の生活について説明します 退院療養計画書、診察券をお渡しし ます 必要時、管理栄養士の介入がありま す