

心臓カテーテル治療計画表(PCI)

患者名(殿)

医師
看護師

薬剤師
管理栄養士

バス開始日 /

入院日 月 日		当日(月 日)		治療開始予定 時 分		翌日		退院日	
目標		・安全に治療が受けることができる ・治療後、合併症がなく安定する ・治療後の結果、治療方針が理解できる							
内服		・薬剤師より内服薬の説明があります ・希望時安定剤があります							
治療・検査	・身長・体重・腹囲測定 ・血液検査 ・心電図 	足からの場合		肘からの場合		手首からの場合		親指の付け根からの場合	
		・治療は足の付け根からします ・病衣はガウン式のを着用します ・治療前より点滴を開始します ・両足の動脈が触れるところ2ヶ所(足の甲・くるぶし)に印をつけます ・排尿をすませ、下着を脱ぎベッドで向かいます (アクセサリ類は全て外して下さい)		・治療は肘からします ・病衣はガウン式のを着用します ・治療前より点滴を開始します ・排尿をすませ車いすで向かいます (アクセサリ類は全て外して下さい)		・治療は手首からします ・病衣はガウン式のを着用します ・治療前より点滴を開始します ・1時間半前に痛み止めのシールを手首に貼ります ・排尿をすませ車いすで向かいます (アクセサリ類は全て外して下さい)		・治療は親指の付け根からします ・病衣はガウン式のを着用して下さい ・治療前より点滴を開始します ・1時間半前に痛み止めのシールを2枚手首に貼ります ・排尿をすませ、車いすで向かいます (アクセサリ類は全て外して下さい)	
		足から治療した場合		肘から治療した場合		手首から治療した場合		親指の付け根からの場合	
		・治療後、約6時間ベッドで安静となります 治療した足以外は動かしますが、起き上がり、座ることは禁止です 食事や排泄は看護師がお手伝いします ・6時間後より寝返りやベッドの上で座ることはできます。 立ったり、歩いたりすることは翌日まで控えて下さい ・お水かお茶をコップ3～4杯飲みましょう		・治療終了後、副え板をして包帯固定します 4時間後、看護師が副え板を除去します テープは翌日まで貼ったままにしておいて下さい 治療後はベッド上でお過ごし下さい トイレは歩いて行けます ・お水かお茶をコップ3～4杯飲みましょう		・治療終了後、固定具で圧迫します 看護師が2時間、4時間、6時間後にゆるめて、翌日に固定具をはずします 治療後はベッド上でお過ごし下さい トイレは歩いて行けます ・お水かお茶をコップ3～4杯飲みましょう		・治療後、手首付近に2枚のテープを貼ります。 帰宅1時間後と、3時間後に貼っているテープを看護師が除去します 治療後はベッド上でお過ごし下さい トイレは歩いて行けます ・お水かお茶をコップ3～4杯飲みましょう	
		・翌朝まで、点滴を続けて行います							
食事	・塩分やカロリー制限の治療食となる場合があります ・シャワー室を利用してください	・絶飲食の必要はありません ・足から治療した方は、看護師が食事のお手伝いをします ・除毛後、シャワー浴を行います							
清潔									
その他	・治療当日はご家族の方が来院して下さい	・治療は1時間程度です ・治療中、ご家族の方は待合室でお待ち下さい ・治療終了後、結果をご説明しますのでご家族の方も同席して下さい (ご都合が悪い場合は、あらかじめお知らせ下さい)						・退院時のお薬を、お渡しします 家に残っている薬がある場合は医師か看護師にお知らせ下さい 看護師が傷の確認をします ・看護師が止血を確認します ・カットバンは貼ったままでお過ごし下さい ・看護師が傷の確認をします 安静度は自由です 発作時の対応や退院後の生活について、退院時に説明させていただきます。 ・検査または治療後、翌々日より入浴できます 入浴の際に傷口のカットバンを剥がしてかまいません ・看護師より退院の説明があります ・お薬や予約券などをお渡しします ・退院時間は午前11時まで 御協力をお願いします	