

化学療法計画書

ID							
氏名							
生年月日							
実施部署				発行日			
身長 (cm)	160	体重 (kg)	50	体表面積 (m ²)	1.50	Ccr (mL/min)	70.0

指示医師:			
指導医師:			
投与開始予定日:	年	月	日
投与終了日:	年	月	日

病名	非小細胞肺癌
治療法	キイトルーダ(6週毎)+アブラキサン+カルボプラチン併用療法

	1	2	3
抗癌剤・商品名	キイトルーダ	カルボプラチン	アブラキサン
規格	100mg/4mL	50mg/5mL 150mg/150mL 450mg/45mL	100mg
一般名	ペムブロリズマブ	カルボプラチン	アルブミン懸濁型パクリタキセル
一日投与量(規定)	400mg/body	AUC*6	100mg/m ²
患者情報から算出した一日投与量	400 mg	570 mg	150.11 mg
実際の投与量	400 mg	500 mg	150 mg
		AUC*5.3	99.9 mg/m²
投与日	day1	day1,22	day1,8,15,22,29,36
1クール期間	42日間		
予定クール数			
検査スケジュール	原則的に投与日にiCI施行前セット 検査データに応じて臨時に検査実施		

適応基準	扁平上皮非小細胞肺癌
推奨経口剤	○このレジメンは中等度催吐性リスク群です。 ※5HT3受容体拮抗薬+点滴デカドロン(点滴レジメン組込み)以外に以下の経口制吐剤を推奨します。 デカドロン: day2, 3, 4: 8mg/日 イメド: day1(抗癌剤投与前)125mg、day2・day3 80mg/日はオプションとして使用可。 ただし、デカドロン投与量を半減すること。
禁忌	1.本剤の成分又は他の白金を含む薬剤、パクリタキセル、アルブミンに対し重篤な過敏症の既往歴のある患者 2.高度な骨髄抑制のある患者 3.妊婦又は妊娠している可能性のある婦人 4.重篤な腎障害のある患者 5.感染症を合併している患者
中止基準	【day1,22】投与前の好中球数: 1500/mm3未満、血小板数: 100,000/mm3未満 骨髄機能が回復するまでは投与延期 【day8,15,29,36】投与前の好中球数: 500/mm3未満、血小板数: 50,000/mm3未満 骨髄機能が回復するまでは投与延期 (アブラキサン添付文書内投与基準に準拠)
副作用	<p>●キイトルーダ</p> <p>重大 1.間質性肺疾患 2.大腸炎、重度の下痢 3.皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑 4.類天疱瘡 5.神経障害 6.肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎 7.甲状腺機能障害 8.下垂体機能障害 9.副腎機能障害 10.1型糖尿病 11.腎障害 12.肺炎 13.筋炎、横紋筋融解症 14.重症筋無力症 15.心筋炎 16.脳炎、髄膜炎 17.免疫性血小板減少性紫斑病 18.溶血性貧血 19.赤芽球癆 20.Infusion reaction</p> <p>その他 (10%以上)下痢、悪心、疲労、そう痒症、発疹 (1~10%未満)貧血、好中球減少、血小板減少、白血球減少、リンパ球減少、血中TSH増加、血中TSH減少、涙液増加、 眼乾燥、嘔吐、便秘、口内乾燥、腹痛、口内炎、上腹部痛、無力症、発熱、末梢性浮腫、 インフルエンザ様疾患、粘膜の炎症、悪寒、倦怠感、食欲減退、低マグネシウム血症、関節痛、筋肉痛、 背部痛、四肢痛、筋痙攣、頭痛、味覚異常、浮動性めまい、末梢性感覚ニューロパチー、錯覚、 血中クレアチニン増加、呼吸困難、咳嗽、脱毛症、皮膚乾燥、斑状丘疹状皮疹、尋常性白斑、紅斑、湿疹、 体重減少</p> <p>●アブラキサン</p> <p>重大 1.白血球減少などの骨髄抑制 2.感染症 3.末梢神経障害、麻痺 4.脳神経麻痺 5.ショック、アナフィラキシー 6.間質性肺疾患 7.急性呼吸窮迫症候群 8.心筋梗塞、うっ血性心不全、心伝導障害 9.脳卒中、肺塞栓、肺水腫、血栓性静脈炎 10.難聴、耳鳴 11.消化管壊死、消化管穿孔、消化管出血、消化管潰瘍 12.重篤な腸炎 13.腸管閉塞、腸管麻痺 14.肝機能障害、黄疸 15.肺炎 16.急性腎障害 17.中毒性表皮壊死融解症(TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群) 18.播種性血管内凝固症候群(DIC)</p> <p>その他 (20%以上)脱毛(症)、倦怠感、悪心 (5~20%未満)発疹、味覚異常、無力症、発熱、浮腫、下痢、口内炎、嘔吐、便秘、関節痛、筋肉痛、食欲不振、ALT上昇、 AST上昇</p> <p>●カルボプラチン</p> <p>重大 1.汎血球減少等の骨髄抑制 2.ショック、アナフィラキシー 3.間質性肺炎 4.急性腎障害、ファンコニー症候群 5.肝不全、 肝機能障害、黄疸 6.消化管壊死、消化管穿孔、消化管出血、消化管潰瘍 7.出血性腸炎、偽膜性大腸炎 8.麻痺性イレウス 9.脳梗塞、肺梗塞 10.血栓・塞栓症 11.心筋梗塞、うっ血性心不全 12.溶血性尿毒症症候群 13.急性呼吸窮迫症候群 14.播種性血管内凝固症候群(DIC) 15.急性肺炎 16.難聴 17.白質脳症 18.腫瘍崩壊症候群</p> <p>その他 (10%以上または頻度不明)悪心・嘔吐、食欲不振、蕁麻疹、ALT上昇、脱毛、全身倦怠感、無力症、尿酸上昇、悪寒、脱水、 体重減少、アルブミン低下、呼吸困難 (1~10%未満)下痢、口内炎、腹痛、便秘、血尿、蛋白尿、発疹、末梢神経障害、頭痛、AST上昇、Al-P上昇、ビリルビン上昇、 LDH上昇、γ-GTP上昇、血清ナトリウム、カリウム、クロール、カルシウム、リン、マグネシウム等の異常、発熱、 浮腫</p>
備考	

キイトルーダ+アブラキサン+カルボプラチン併用療法 観察記録①

所要時間: 3時間

氏名: ID() 年齢: (才)

施行日	クール	回目	施行前内服薬()	入外()				
医師	指示医師:		抗癌剤用量 計画書設定量 計画書設定量より減量 計画書設定量より増量 減量・増量理由	抗がん剤以外の薬剤の変更・追加				
	キイトルーダ (mg) 一般名(ペムブロリズマブ) アブラキサン (mg) 一般名(アブラキサン懸濁型パクリタキセル) カルボプラチン (mg) 一般名(カルボプラチン)	<input type="checkbox"/> 投与決定 <input type="checkbox"/> 未決定 <input type="checkbox"/> 延期・中止			投与開始時間 調剤 実施			
投与指示	本体	側管						
	生食 250mL		3時間かけて点滴【83mL/hr】					
		生食100mL+キイトルーダ	30分かけて点滴【200mL/hr】 ※フィルター付き点滴ラインを使用					
		生食 100mL +アロキシ1V +デカドロン 3 A	30分かけて点滴【200mL/hr】					
		生食100mL+アブラキサン	30分かけて点滴【 0 mL/h】					
	5%ブドウ糖 250mL +カルボプラチン	1時間かけて点滴【 250 mL/h】						
本体終了後抜去								
バイタル	項目	投与前	キイトルーダ投与中	アブラキサン投与中	カルボプラチン投与中	投与後	●穿刺部位 末梢(右手 左手 その他:) CVポート(逆血 有り 無し) ●穿刺針 末梢留置針 (20G 22G 24G) Cvポート穿刺針22G (16mm 19mm 25mm)	サイン
	体温							
	脈拍							
	血圧	/	/	/	/	/		
	SpO ₂							
	呼吸困難							
観察	紅斑・発疹						看護記録	サイン
	悪寒							
	疼痛							
	嘔気							
	嘔吐							

アクシデント
(過敏反応、不整脈、血管外漏出等)

お薬手帳



キイトルーダ+アブラキサン+カルボプラチン併用療法 観察記録②

所要時間: 2時間30分

氏名: ID() 年齢: (才)

施行日	クール	回目	施行前内服薬()	入外()			
医師	指示医師:		抗癌剤用量 計画書設定量 計画書設定量より減量 計画書設定量より増量 減量・増量理由	抗がん剤以外の薬剤の変更・追加			
	アブラキサン (mg) 一般名(アブラキサン懸濁型パクリタキセル) カルボプラチン (mg) 一般名(カルボプラチン)						
<input type="checkbox"/> 投与決定 <input type="checkbox"/> 未決定 <input type="checkbox"/> 延期・中止				投与開始時間 調剤 実施			
投与指示	本体	側管					
	生食 250mL		2時間30分かけて点滴【100mL/hr】				
		生食 100mL +アロキシ1V +デカドロン 3 A	30分かけて点滴【200mL/hr】				
		生食100mL+アブラキサン	30分かけて点滴【 0 mL/h】				
		5%ブドウ糖 250mL +カルボプラチン	1時間かけて点滴【 250 mL/h】				
本体終了後抜去							
バイタル	項目	投与前	アブラキサン投与中	カルボプラチン投与中	投与後	●穿刺部位 末梢(右手 左手 その他:) CVポート(逆血 有り 無し) ●穿刺針 末梢留置針 (20G 22G 24G) Cvポート穿刺針22G (16mm 19mm 25mm)	サイン
	体温						
	脈拍						
	血圧	/	/	/	/		
	SpO ₂						
観察	呼吸困難					看護記録 サイン	
	紅斑・発疹						
	悪寒						
	疼痛						
	嘔気 嘔吐						

アクシデント
(過敏反応、不整脈、血管外漏出等)

お薬手帳

