

化学療法計画書

ID					
氏名					
生年月日					
実施部署			発行日		
身長 (cm)	160	体重 (kg)	50	体表面積 (m ²)	1.50

指示医師:		
指導医師:		
投与開始予定日:	年	月 日
投与終了日:	年	月 日

病名	悪性リンパ腫
治療法	リツキサン+レブラミド併用(R ²)療法

	1	2
抗癌剤・商品名	リツキサン	レブラミド
規格	100mg/10mL 500mg/50mL	5mg
一般名	リツキシマブ	レナリドミド
一日投与量(規定)	375mg/m ²	20mg/day
患者情報から算出した一日投与量	562.92 mg	20 mg
実際の投与量	570 mg	20 mg
	379.7 mg/m²	20 mg
投与日	day1,8,15,22(1クール目) day1(2-5クール目)	day1-21
1クール期間	28日間	
予定クール数	最大12コースまで	
検査スケジュール	原則的に投与日に化学療法施行前セット 検査データに応じて臨時に検査実施	

適応基準	再発難治性の濾胞性リンパ腫および節性辺縁帯リンパ腫
推奨経口剤	○このレジメンは最小度催吐性リスク群です。静注、経口問わず制吐剤は不要です。
禁忌	1.本剤の成分又はマウスタンパク質由来製品に対する重篤な過敏症又はアナフィラキシーの既往歴のある患者 2.妊婦又は妊娠している可能性のある女性 3.適正管理手順を遵守できない患者
中止基準	投与前の好中球数:1000/mm ³ 未満が7日間持続もしくは500/mm ³ 未満、血小板数:50,000/mm ³ 未満 骨髄機能が回復するまでは投与延期 (レブラミド添付文書内の投与基準に準拠)
副作用	<p>●リツキサン</p> <p>重大 1.Infusion reaction 2.腫瘍崩壊症候群 3.B型肝炎ウイルスの再活性化による劇症肝炎、肝炎の増悪 4.肝機能障害、黄疸 5.皮膚粘膜症状 6.血球減少 7.感染症 8.進行性多巣性白質脳症(PML) 9.間質性肺炎 10.心障害 11.腎障害 12.消化管穿孔・閉塞 13.血圧下降 14.可逆性後白質脳症症候群等の脳神経症状</p> <p>その他 (5%以上) 咽喉頭炎、鼻炎、口腔咽頭不快感、咳、呼吸障害、血圧上昇、頻脈、潮紅、悪心・嘔吐、腹痛、口内炎、食欲不振、下痢、発熱、悪寒、そう痒、発疹、ほてり、関節痛、疼痛、倦怠感、虚脱感、頭痛、多汗、浮腫、異常感覚、しびれ感、貧血、電解質異常、ALT上昇、AST上昇、CRP上昇、LDH上昇、総蛋白減少</p> <p>(5%未満) 喘鳴、鼻出血、動悸、血管拡張、徐脈、末梢性虚血、口内乾燥、便秘、しぶり腹、尋麻疹、筋肉痛、インフルエンザ様症候群、胸痛、体重増加、無力症、眩暈、不眠症、好酸球増多、BUN上昇、クレアチニン上昇、Al-P上昇、総ビリルビン上昇、尿酸値上昇、帯状疱疹、結膜炎、皮脂欠乏性湿疹、投与部位反応(疼痛、腫脹等)、アルブミン減少、しゃっくり</p> <p>●レブラミド</p> <p>重大 1.深部静脈血栓症、肺塞栓症 2.脳梗塞、一過性脳虚血発作 3.骨髄抑制 4.感染症 5.進行性多巣性白質脳症(PML) 6.皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊死症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN) 7.過敏症 8.腫瘍崩壊症候群 9.間質性肺疾患 10.心筋梗塞、心不全、不整脈 11.末梢神経障害 12.甲状腺機能低下症 13.消化管穿孔 14.起立性低血圧 15.痙攣 16.肝機能障害、黄疸 17.重篤な腎障害 18.椎奇形性</p> <p>その他 (5%以上) 便秘、下痢、悪心、筋痙攣、食欲不振、味覚異常、そう痒症、疲労、腫瘍フレア、無力症、末梢性浮腫 (1~5%未満) 嘔吐、口内乾燥、腹痛、消化不良、口内炎、上腹部痛、低血圧、呼吸困難、咳嗽、四肢痛、関節痛、筋肉痛、背部痛、低カリウム血症、低カルシウム血症、高血糖、低リン酸血症、浮動性めまい、振戦、不眠症、頭痛、傾眠、錯乱状態、皮膚乾燥、紅斑、多汗、脱毛症、霧視、白内障、発熱、体重減少、浮腫、倦怠感</p>
備考	●リツキサンは1-5コース目までの投与。6コース目以降はレブラミド単独。

リツキサン+レブラミド併用(R²)療法 観察記録

所要時間:

氏名: ID() 年齢: (才)

施行日	クール	回目	施行前内服薬()	入外()
医師	指示医師:		抗癌剤用量 計画書設定量 計画書設定量より減量 計画書設定量より増量 減量・増量理由	抗がん剤以外の薬剤の変更・追加
	リツキサン(mg) 一般名(リツキシマブ)	レブラミド(経口: mg) 一般名(レナリドミド)		
<input type="checkbox"/> 投与決定 <input type="checkbox"/> 未決定 <input type="checkbox"/> 延期・中止				投与開始時間 調剤 実施
投与指示	本体	側管		
	生食500mL		リツキサン投与終了時に終わるように点滴	
	カロナール(200mg) 2錠		経口内服	
	プレドニゾン(5mg)			
	ポララミン 1A		静注	
生食500mL+リツキサン 【※1mg/mLとなるように調製】		※下表参照		
本体終了後抜去				

