

化学療法計画書

ID					
氏名					
生年月日					
実施部署			発行日		
身長 (cm)	160	体重 (kg)	50	体表面積 (m ²)	1.50

指示医師:		
指導医師:		
投与開始予定日:	年	月 日
投与終了日:	年	月 日

病名	悪性リンパ腫
治療法	アドセトリス+CHP療法

	1	2	3	4
抗癌剤・商品名	アドセトリス	アドリアシン	エンドキサン	プレドニゾン
規格	50mg	10mg 50mg	100mg 500mg	1mg錠 5mg錠
一般名	ブレンツキシマブ ベドチン	ドキソルビシン	シクロフォスファミド	プレドニゾン
一日投与量(規定)	1.8mg/kg	50mg/m ²	750mg/m ²	100mg/day
患者情報から算出した 一日投与量	90 mg	75.06 mg	1125.84 mg	100 mg
実際の投与量	90 mg	75 mg	1125 mg	100 mg
	1.8 mg/m²	50 mg/m²	749.4 mg/m²	100 mg
投与日	day1			day1-5
1クール期間	21日間			
予定クール数				
検査スケジュール	原則的に投与日に化学療法施行前セット 検査データに応じて臨時に検査実施			

適応基準	未治療のCD30陽性の末梢性T細胞リンパ腫(PTCL)
推奨 経口剤	○このレジメンは高度催吐性リスク群です。 ※5HT3受容体拮抗薬+プレドニゾン(治療目的としての)以外に以下の経口制吐剤を推奨します。 イメンド:1日目(点滴開始前)125mg、2日目,3日目:80mg/日
禁忌	1.本剤の成分に対し重度の過敏症の既往歴のある患者 2.プレオマイシン、ペントスタチン、デスマプレシン酢酸塩水和物(男性における夜間多尿による夜間頻尿)を投与中の患者 3.心機能異常又はその既往歴のある患者 4.重症感染症を合併している患者
中止基準	投与前の好中球数:1000/mm ³ 未満、血小板数:50,000/mm ³ 未満 骨髄機能が回復するまでは投与延期 (CTCAE ver4.0 における Grade3 の血液毒性に準拠)
副作用	<p>●アドセトリス</p> <p>重大 1.末梢神経障害(58.2%) 2.感染症(25.1%) 3.進行性多巣性白質脳症(PML)(頻度不明) 4.骨髄抑制(61.4%) 5.Infusion reaction(7.8%) 6.腫瘍崩壊症候群(0.5%) 7.皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)(0.2%) 8.急性膵炎(0.1%) 9.劇症肝炎(頻度不明)、肝機能障害(9.1%) 10.肺障害(1.2%)</p> <p>その他(10%以上)悪心(42.8%)、便秘、嘔吐、下痢、口内炎、腹痛、脱毛症、食欲減退、疲労、発熱、体重減少 (5%以上10%未満)頭痛、味覚異常、浮動性めまい、不眠症、消化不良、上腹部痛、呼吸困難、筋肉痛、関節痛、無力症</p> <p>●アドリアシン</p> <p>重大 1.心筋障害、心不全 2.骨髄抑制 3.ショック 4.間質性肺炎 5.萎縮膀胱(膀胱注入時)</p> <p>その他 脱毛(61.6%)、悪心・嘔吐(42.9%)、食欲不振(39.7%)、口内炎(22.2%)</p> <p>●エンドキサン</p> <p>重大 1.ショック、アナフィラキシー様症状 2.骨髄抑制 3.出血性膀胱炎 4.イレウス、胃腸出血 5.間質性肺炎、肺繊維症 6.心筋障害、心タンポナーデ、心膜炎、7.抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH) 8.皮膚粘膜眼症候群、 中毒性表皮壊死症 9.肝機能障害、黄疸 10.急性腎不全 11.横紋筋融解症</p> <p>その他 悪心・嘔吐(20%)、脱毛(24%)</p> <p>●プレドニゾン</p> <p>重大 1.誘発感染症、感染症の増悪 2.続発性副腎皮質機能不全、糖尿病 3.消化管潰瘍、消化管穿孔、消化管出血 4.膵炎 5.精神変調、うつ状態、痙攣 6.骨粗鬆症、大腿骨及び上腕骨等の骨頭無菌性壊死、ミオパチー 7.緑内障、後嚢白内障、 中心性漿液性網脈絡膜症、多発性後極部網膜色素上皮症 8.血栓症 9.心筋梗塞、脳梗塞、動脈瘤 10.硬膜外脂肪腫 11.腱断裂</p> <p>その他 添付文書参照</p>
備考	

アドセトリス+CHP療法 観察記録

所要時間:3時間30分

氏名: ID() 年齢: (才)

施行日	クール	回目	施行前内服薬()	入外()
医師	指示医師:		抗癌剤用量 計画書設定量 計画書設定量より減量 計画書設定量より増量 減量・増量理由	抗がん剤以外の薬剤の変更・追加
	アドリアシン (mg) 一般名(ドキシソルビシン)	エンドキサン (mg) 一般名(シクロフォスファミド)		
	アドセトリス (mg) 一般名(ブレンツキシマブ ベドチン)	プレドニゾン (経口: mg) 一般名(シクロフォスファミド)		
	<input type="checkbox"/> 投与決定 <input type="checkbox"/> 未決定 <input type="checkbox"/> 延期・中止			投与開始時間 調剤 実施
投与指示	本体	側管		
	生食250mL		3時間30分かけて点滴【71mL/h】	
	プレドニゾン		経口内服(アドリアシン開始30分前)	
	生食100mL +アロキシ1V		30分かけて点滴【200mL/h】	
	生食100mL+アドリアシン		30分かけて点滴【200mL/h】	
	生食500mL+エンドキサン		60分かけて点滴【500mL/h】	
生食100mL+アドセトリス		60分かけて点滴【 mL/h】		
※注射用水で溶解 ※体重85kg以上の場合は生食250mLへ希釈すること				
本体終了後抜去				