

# 化学療法計画書

ID						指示医師:		
氏名						指導医師:		
生年月日						投与開始予定日: 年 月 日		
実施部署			発行日			投与終了日: 年 月 日		
身長 (cm)	160	体重 (kg)	50	体表面積 (m <sup>2</sup> )	1.50			

病名	大腸癌
治療法	【2週毎】ビラフトピ+メクトピ+アービタックス併用療法

	1	2	2
抗癌剤・商品名	ビラフトピカプセル	メクトピ錠	アービタックス
規格	50mg 75mg	15mg	100mg/20mL
一般名	エンコラフェニブ	ビニメチニブ	セツキシマブ
一日投与量(規定)	300mg/body(分1)	90mg/body(分2)	500mg/m <sup>2</sup>
患者情報から算出した一日投与量	<b>300 mg</b>	<b>90 mg</b>	<b>初回 750.56 mg</b>
実際の投与量	<b>mg</b>	<b>mg</b>	<b>初回 600 mg</b>
			<b>初回 399.7 mg/m<sup>2</sup></b>
投与日	day1-7		day1
1クール期間	14日間		
予定クール数			
検査スケジュール	原則的に投与日に化学療法施行前セット 検査データに応じて臨時に検査実施		

適応基準	がん化学療法後に増悪したBRAF V600E 遺伝子変異陽性の治癒切除不能な進行・再発大腸癌
推奨経口剤	○このレジメンは最小度催吐性リスク群です。静注、経口問わず制吐剤は不要です。
禁忌	1.本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
中止基準	投与前の好中球数:1000/mm <sup>3</sup> 未満、血小板数:50,000/mm <sup>3</sup> 未満 骨髄機能が回復するまでは投与延期 (CTCAE ver4.0 における Grade3 の血液毒性に準拠)
副作用	<p>●ビラフトピ</p> <p><b>重大</b> 1.皮膚悪性腫瘍 2.眼障害 3.心機能障害 4.肝機能障害 5.横紋筋融解症 6.高血圧、高血圧クリーゼ 7.出血 8.手掌・足底発赤知覚不全症候群</p> <p><b>その他</b> (5%以上) 貧血、霧視、下痢、悪心、嘔吐、腹痛、便秘、口内炎、疲労、無力症、発熱、食欲減退、関節痛、筋肉痛、血中CK増加、頭痛、ざ瘡様皮膚炎、発疹、脱毛症、皮膚乾燥、過角化、そう痒症、メラノサイト性母斑 (5%未満)リンパ球減少、好中球減少、動悸、期外収縮、僧帽弁閉鎖不全症、耳鳴、回転性めまい、眼瞼炎、色視症、眼乾燥、目の障害、眼刺激、羞明、硝子体浮遊物、変視症、視力障害、結膜炎、腹部不快感、腹部膨満、大腸炎、口内乾燥、消化不良、鼓腸、胃食道逆流性疾患、肺炎、アミラーゼ増加、悪寒、冷感、インフルエンザ様疾患、浮腫、末梢腫脹、全身健康状態低下、乾燥症、倦怠感、過敏症、毛包炎、爪真菌症、咽頭炎、ヘルペス感染、カンジダ感染、胃腸炎、高コレステロール血症、血中リン減少、高カリウム血症、高トリグリセリド血症、高尿酸血症、低アルブミン血症、リパーゼ増加、低ナトリウム血症、関節炎、背部痛、筋力低下、成長痛、筋骨格痛、四肢痛、頸部痛、四肢不快感、筋痙攣、顔面麻痺、視野欠損、不安、不眠症、睡眠障害、異常感覚、錯感覚、失神、傾眠、末梢性ニューロパチー、浮動性めまい、味覚異常、血中クレアチニン増加、頻尿、咳嗽、呼吸困難、胸水、発声障害、皮膚炎、毛髪障害、毛質異常、多汗症、寝汗、光線過敏性反応、蕁麻疹、尋常性白斑、皮膚腫瘍、皮膚色素減少、皮膚色素過剰、脂肪織炎、紅斑、掌蹠角皮症、皮膚病変、低血圧、ほてり、体重減少、体重増加、アクロコルドン、脂漏性角化症、乳頭腫、扁平上皮癌</p> <p>●メクトピ</p> <p><b>重大</b> 1.眼障害 2.心機能障害 3.肝機能障害 4.横紋筋融解症 5.高血圧、高血圧クリーゼ 6.出血</p> <p><b>その他</b> (5%以上) 貧血、霧視、下痢、悪心、嘔吐、腹痛、便秘、口内炎、疲労、無力症、発熱、食欲減退、関節痛、筋痙攣、筋肉痛、血中CK増加、味覚異常、頭痛ざ瘡様皮膚炎、発疹、脱毛症、皮膚乾燥、過角化、そう痒症 (5%未満)リンパ球減少、好中球減少、動悸、期外収縮、僧帽弁閉鎖不全症、耳鳴、回転性めまい、眼瞼炎、色視症、眼乾燥、目の障害、眼刺激、羞明、硝子体浮遊物、変視症、視力障害、結膜炎、腹部不快感、腹部膨満、大腸炎、口内乾燥、消化不良、鼓腸、胃食道逆流性疾患、肺炎、アミラーゼ増加、悪寒、冷感、インフルエンザ様疾患、浮腫、末梢腫脹、全身健康状態低下、乾燥症、倦怠感、過敏症、毛包炎、爪真菌症、咽頭炎、ヘルペス感染、カンジダ感染、胃腸炎、高コレステロール血症、血中リン減少、高カリウム血症、高トリグリセリド血症、高尿酸血症、低アルブミン血症、リパーゼ増加、低ナトリウム血症、関節炎、背部痛、筋力低下、成長痛、筋骨格痛、四肢痛、頸部痛、四肢不快感、顔面麻痺、視野欠損、不安、不眠症、睡眠障害、異常感覚、錯感覚、失神、傾眠、末梢性ニューロパチー、浮動性めまい、嗜眠、血中クレアチニン増加、頻尿、急性腎障害、咳嗽、呼吸困難、胸水、皮膚炎、毛髪障害、毛質異常、多汗症、寝汗、光線過敏性反応、蕁麻疹、尋常性白斑、皮膚腫瘍、皮膚色素減少、皮膚色素過剰、脂肪織炎、紅斑、掌蹠角皮症、皮膚剥脱、低血圧、ほてり、体重減少、体重増加、アクロコルドン、メラノサイト性母斑、脂漏性角化症、乳頭腫、扁平上皮癌</p> <p>●アービタックス</p> <p><b>重大</b> 1.重度のinfusion reaction 2.重度の皮膚症状 3.間質性肺疾患 4.心不全 5.低マグネシウム血症 6.重度の下痢 7.血栓塞栓症 8.感染症</p> <p><b>その他</b> (10%以上) 疲労、無力症、悪心、口内炎、発疹、ざ瘡/ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、そう痒症、皮膚亀裂 (0.5~10%未満) 発熱、体重減少、粘膜の炎症、悪寒、疼痛、浮腫、倦怠感、食欲不振、嘔吐、便秘、腹痛、消化不良、好中球減少症、白血球減少症、血小板減少症、リンパ球減少症、ヘモグロビン減少、好中球増加症、白血球増加症、低カルシウム血症、低アルブミン血症、低カリウム血症、脱水、低ナトリウム血症、低リン酸血症、総蛋白減少、ALT上昇、AST上昇、Al-P上昇、頭痛、不眠症、末梢神経障害、鼻出血、呼吸困難、咳嗽、爪の障害、脱毛症、皮膚毒性、手足症候群、多毛症、口唇炎、蕁麻疹、皮膚反応、毛髪障害、結膜炎、眼瞼炎、過敏症、尿蛋白</p>
備考	●マダニ咬傷歴あるいは赤肉(牛肉等)アレルギーのある患者はアービタックスによるアナフィラキシーに注意すること

【2週毎】ビラフトビ+メクトビ+アービタックス併用療法 観察記録

所要時間: 3時間

氏名: ID( ) 年齢: ( 才)

施行日	クール	回目	施行前内服薬( )	入外( )
医師	指示医師: アービタックス ( mg ) 一般名(セツキシマブ)		<b>抗癌剤用量</b> 計画書設定量 計画書設定量より減量 計画書設定量より増量 減量・増量理由	抗がん剤以外の薬剤の変更・追加
	<input type="checkbox"/> 投与決定 <input type="checkbox"/> 未決定 <input type="checkbox"/> 延期・中止			投与開始時間 調剤 実施
投与指示	本体	側管		
	生食250mL		3時間かけて点滴【83mL/h】	
	生食100mL + ポララミン1A + デカドロン 2 A		30分かけて点滴【200mL/h】	
	生食250mL + アービタックス ※Total 250mLに調製		2時間かけて点滴【 125 mL/h】	
本体終了後抜去				

アクシデント  
(過敏反応、不整脈、血管外漏出等)

お薬手帳



※身長160cm 体重50kg 体表面積1.5㎡の患者さんの場合の  
1日治療に掛かる抗がん剤薬価(day1のみ)  
○ビラフトビ: 19,079円 メクトビ: 29,558円 アービタックス: 282,472円