

# 化学療法計画書

ID					
氏名					
生年月日					
実施部署			発行日		
身長 (cm)	160	体重 (kg)	50	体表面積 (m <sup>2</sup> )	1.50

指示医師:			
指導医師:			
投与開始予定日:	年	月	日
投与終了日:	年	月	日

病名	乳癌
治療法	TC療法

	1	2
抗癌剤・商品名	タキソテール	エンドキサン
規格	20mg 80mg	100mg 500mg
一般名	ドセタキセル	シクロフォスファミド
一日投与量(規定)	75mg/m <sup>2</sup>	600mg/m <sup>2</sup>
患者情報から算出した一日投与量	<b>112.58 mg</b>	<b>900.67 mg</b>
実際の投与量	<b>110 mg</b>	<b>900 mg</b>
	<b>73.3 mg/m<sup>2</sup></b>	<b>599.6 mg/m<sup>2</sup></b>
投与日	day1	
1クール期間	21日間	
予定クール数		
検査スケジュール	原則的に投与日に化学療法施行前セット 検査データに応じて臨時に検査実施	

適応基準	HER2陰性乳癌
推奨経口剤	○このレジメンは中等度催吐性リスク群です。 ※5HT3受容体拮抗薬+点滴デカドロン(点滴レジメン組込み)以外に以下の経口制吐剤を推奨します。 デカドロン: day2、3、4: 8mg/日 アプレピタント: day1(抗癌剤投与前) 125mg、day2・day3 80mg/日はオプションとして使用可。 ただし、デカドロン投与量を半減すること。
禁忌	1. 重篤な骨髄抑制のある患者 2. 感染症を合併している患者 3. 発熱を有し感染症の疑われる患者 4. 本剤又はポリソルベート80含有製剤に対し重篤な過敏症の既往歴のある患者 5. 妊婦又は妊娠している可能性のある女性 6. ペントスタチンを投与中の患者
中止基準	投与前の好中球数: 1000/mm <sup>3</sup> 未満、血小板数: 50,000/mm <sup>3</sup> 未満 骨髄機能が回復するまでは投与延期 (CTCAE ver4.0 における Grade3 の血液毒性に準拠)
副作用	<p>●タキソテール</p> <p><b>重大</b> 1. 骨髄抑制 2. ショック症状、アナフィラキシー 3. 黄疸、肝不全、肝機能障害 4. 急性腎障害 5. 間質性肺炎、肺線維症 6. 心不全 7. 播種性血管内凝固症候群 8. 腸管穿孔、胃腸出血、虚血性大腸炎、大腸炎 9. イレウス 10. 急性呼吸促進症候群 11. 急性膵炎 12. 皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊死症 (TEN)、多形紅斑 13. 心タンポナーデ、肺水腫、浮腫・体液貯留 14. 心筋梗塞、静脈血栓塞栓症 15. 感染症 16. 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH) 17. 重篤な口内炎等の粘膜炎 18. 血管炎 19. 末梢神経障害 20. 四肢の脱力感等の末梢性運動障害 21. Radiation Recall現象</p> <p><b>その他</b> (50%以上) 食欲不振、脱毛、全身倦怠感 (5~50%未満) 悪心・嘔吐、下痢、口内炎、便潜血、アレルギー、発赤、皮疹、しびれ感、AST・ALT・γ-GTP・AI-P・LDH上昇、蛋白尿、K・Na・Cl・Caの異常、BUN上昇、発熱、浮腫、総蛋白・アルブミン・A/G比・CK異常 (5%未満) 腹痛、腹部膨満感、便秘、舌炎、口内乾燥、そう痒感、潮紅、色素沈着、爪疾患、頭痛、意識喪失、見当識障害、めまい、昏迷、難聴、耳鳴、味覚異常、不眠、羞明、視力異常、流涙、結膜炎、筋肉痛、関節痛、筋力低下・脱力感、背部痛、痙攣、総ビリルビン上昇、クレアチニン上昇、尿酸、血尿、乏尿、頻尿、血圧低下、血圧上昇、不整脈、動悸、頻脈、呼吸困難、咽頭炎、咳嗽、静脈炎、疼痛、胸痛、全身痛、熱感、腰痛、鼻出血、ほてり</p> <p>●エンドキサン</p> <p><b>重大</b> 1. ショック、アナフィラキシー 2. 骨髄抑制 3. 出血性膀胱炎、排尿障害 4. イレウス、胃腸出血 5. 間質性肺炎、肺線維症 6. 心筋障害、心不全、心タンポナーデ、心膜炎 7. 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH) 8. 中毒性表皮壊死溶解症 (TEN)、皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症候群) 9. 肝機能障害、黄疸 10. 急性腎障害 11. 横紋筋融解症</p> <p><b>その他</b> (50%以上) 悪心・嘔吐、脱毛 (5%未満) 肝機能異常、黄疸、蛋白尿、浮腫、口渇、潰瘍性口内炎、腹痛、便秘、下痢、発疹、皮膚炎、色素沈着、爪の変形・変色、頭痛、眩暈、不眠、運動失調、心電図異常、心悸亢進、低血圧、副腎皮質機能不全、無月経、発熱、注射時熱感、局所痛、CK上昇</p>
備考	

# TC療法 観察記録

所要時間:3時間

氏名: ID( ) 年齢: ( 才)

施行日	クール	回目	施行前内服薬( )	入外( )						
医師	指示医師:		<b>抗癌剤用量</b> 計画書設定量 計画書設定量より減量 計画書設定量より増量 減量・増量理由	抗がん剤以外の薬剤の変更・追加						
	タキソテール ( mg ) 一般名(ドセタキセル)	エンドキサン ( mg ) 一般名(シクロフォスファミド)								
<input type="checkbox"/> 投与決定 <input type="checkbox"/> 未決定 <input type="checkbox"/> 延期・中止				<table border="1"> <tr> <th>投与開始時間</th> <th>調剤</th> <th>実施</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	投与開始時間	調剤	実施			
投与開始時間	調剤	実施								
投与指示	本体	側管								
	生食250mL		3時間かけて点滴 【83mL/h】							
		生食100mL +パロノセトロン1V +デカドロン 3 A	30分かけて点滴 【200mL/h】							
		5%ブドウ糖250mL+タキソテール	60分かけて点滴 【 250 mL/h】							
		生食100mL+エンドキサン	60分かけて点滴 【 100 mL/h】							
本体終了後抜去										

アクシデント  
(過敏反応、不整脈、血管外漏出等)

お薬手帳



※身長160cm 体重50kg 体表面積1.5㎡の患者さんの場合の  
1日治療に掛かる抗がん剤薬価(day1のみ)  
○タキソテール:56,012円 エンドキサン:2,400円