

# 化学療法計画書

ID					
氏名					
生年月日					
実施部署			発行日		
身長 (cm)	160	体重 (kg)	50	体表面積 (m <sup>2</sup> )	1.50

指示医師:		
指導医師:		
投与開始予定日:	年	月 日
投与終了日:	年	月 日

病名	非小細胞肺癌
治療法	テセントリク+アバスチン併用維持療法

	1	4
抗癌剤・商品名	テセントリク	アバスチン
規格	1200mg/20mL	400mg/16mL 100mg/4mL
一般名	アテゾリズマブ	ベバシズマブ
一日投与量(規定)	1200mg/body	15mg/kg
患者情報から算出した一日投与量	<b>1200 mg</b>	<b>750 mg</b>
実際の投与量	<b>1200 mg</b>	<b>700 mg</b>
		<b>14 mg/kg</b>
投与日	day1	
1クール期間	21日間	
予定クール数		
検査スケジュール	原則的に投与日に化学療法施行前セット 検査データに応じて随時検査実施	

適応基準	化学療法(TKIを除く)未治療の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)
推奨経口剤	○このレジメンは中等度催吐性リスク群です。 ※5HT3受容体拮抗薬+点滴デカドロン(点滴レジメン組込み)以外に以下の経口制吐剤を推奨します。 デカドロン: day2、3、4: 8mg/日 イメンド: day1(抗癌剤投与前) 125mg、day2・day3 80mg/日はオプションとして使用可。ただし、デカドロン投与量を半減すること。
禁忌	1.本剤の成分対し過敏症の既往歴のある患者 2.喀血(2.5mL以上の鮮血の喀出)の既往のある患者
中止基準	投与前の好中球数: 1500/mm <sup>3</sup> 未満、血小板数: 100,000/mm <sup>3</sup> 未満 骨髄機能が回復するまでは投与延期 (IMpower150試験(NEJM 2018;378(24):2288-301)の休薬基準に準拠)
副作用	<p>●テセントリク</p> <p><b>重大</b> 1.間質性肺疾患 2.肝機能障害、肝炎 3.大腸炎、重度の下痢 4.膵炎 5.1型糖尿病 6.甲状腺機能障害 7.副腎機能障害 8.下垂体機能障害 9.脳炎、髄膜炎 10.神経障害 11.重症筋無力症 12.重度の皮膚障害 13.腎機能障害 14.筋炎、横紋筋融解症 15. Infusion reaction 16.発熱性好中球減少症</p> <p><b>その他</b> (5%以上) 下痢、悪心、食欲減退、便秘、発疹、そう痒症、関節痛、貧血、疲労、無力症、発熱、頭痛、味覚異常、不眠症、浮動性めまい、錯感覚、嘔吐、口内炎、腹痛、口内乾燥、咳嗽、呼吸困難、気道感染、鼻出血、鼻炎、皮膚乾燥、脱毛症、斑状丘疹状皮疹、紅斑、筋骨格痛、筋肉痛、血小板減少、好中球減少、白血球減少、リンパ球減少、低ナトリウム血症、低マグネシウム血症、低カリウム血症、脱水、低アルブミン血症、体重減少、倦怠感、浮腫、インフルエンザ様疾患、粘膜の炎症、悪寒、過敏症</p> <p>●アバスチン</p> <p><b>重大</b> 1.ショック、アナフィラキシー 2.消化管穿孔 3.瘻孔 4.創傷治癒遅延: 創し開・術後出血 5.出血 6.血栓塞栓症 7.高血圧性脳症 8.可逆性後白質脳症症候群 9.ネフローゼ症候群 10.骨髄抑制 11.感染症 12.うっ血性心不全 13.間質性肺炎 14.血栓性微血管症</p> <p><b>その他</b> 神経毒性、食欲減退、悪心、口内炎、下痢、嘔吐、便秘、胃腸障害、尿蛋白陽性、肝機能異常、高血圧、上室性頻脈、脱毛症、発疹、皮膚変色、剥脱性皮膚炎、関節痛、肺高血圧症、眼障害、疲労・倦怠感、発熱、蜂巣炎、鼻中隔穿孔、卵巣機能不全、骨盤痛</p>
備考	

# テセントリク+アバスチン併用維持療法 観察記録

所要時間: 初回3時間、2回目2時間  
3回目以降6時間

氏名: ID( ) 年齢: ( 才)

施行日	クール	回目	施行前内服薬( )	入外( )
医師	指示医師:		<b>抗癌剤用量</b> 計画書設定量 計画書設定量より減量 計画書設定量より増量 減量・増量理由	抗がん剤以外の薬剤の変更・追加
	テセントリク ( mg )	アバスチン ( mg )		
一般名(ベバシズマブ)				
投与指示	本体	側管		
	生食250mL		<input type="checkbox"/> 初回 3時間かけて点滴【83mL/h】 <input type="checkbox"/> 2回目 2時間かけて点滴【125mL/h】 <input type="checkbox"/> 3回目以降 90分かけて点滴【167mL/h】	
	生食250mL+テセントリク ※Total 250mLに調製		<input type="checkbox"/> 初回 60分かけて点滴【250mL/h】 <input type="checkbox"/> 2回目以降 30分かけて点滴【500mL/h】 ※フィルター付き点滴ラインを使用	
	生食100mL+アバスチン		<input type="checkbox"/> 初回 90分かけて点滴【 mL/h】 <input type="checkbox"/> 2回目 60分かけて点滴【 mL/h】 <input type="checkbox"/> 3回目以降 30分かけて点滴 mL/h】	
本体終了後抜去				