

# 化学療法計画書

ID					
氏名					
生年 月日					
実施部署			発行日		
身長 (cm)	160	体重 (kg)	50	体表面積 (m <sup>2</sup> )	1.50

指示医師:			
指導医師:			
投与開始予定日:	年	月	日
投与終了日:	年	月	日

病名	胃癌
治療法	【術後補助】タキソテール+TS-1併用療法

	1	2	
抗癌剤・商品名	タキソテール	ティーエスワン配合OD錠	
規格	20mg/0.5mL 80mg/2mL	20mg 25mg	
一般名	ドセタキセル	テガフル・ギメラシル・オテラシル	
一日投与量(規定)	40mg/m <sup>2</sup>	体表面積	一日投与量
患者情報から算出した 一日投与量	<b>60.04 mg</b>	<b>1.25 m<sup>2</sup>未満</b>	<b>80mg/日</b>
実際の投与量	<b>60 mg</b>	<b>1.25 m<sup>2</sup>以上1.5 m<sup>2</sup>未満</b>	<b>100mg/日</b>
	<b>40 mg/m<sup>2</sup></b>	<b>1.5 m<sup>2</sup>以上</b>	<b>120mg/日</b>
投与日	day1(1コース目は投与しない)	day1-14	
1クール期間	21日間		
予定クール数	最大7コース(1コース目はタキソテールなし)		
検査スケジュール	原則的に投与日に化学療法施行前セット 検査データに応じて臨時に検査実施		

適応基準	術後補助化学療法が必要なStageⅢの胃癌
推奨 経口剤	○このレジメンは軽度催吐性リスク群です。推奨される経口制吐剤はありません。
禁忌	1.重篤な骨髄抑制のある患者 2.感染症を合併している患者 3.発熱を有し感染症の疑われる患者 4.本剤又はポリソルベート80含有製剤に対し重篤な過敏症の既往歴のある患者 5.妊婦又は妊娠している可能性のある患者 6.重篤な腎障害のある患者 7.重篤な肝障害のある患者 8.他のフッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤(これらの薬剤との併用療法を含む)を投与中の患者 9.フルシトシンを投与中の患者
中止基準	投与前の好中球数:1000/mm <sup>3</sup> 未満、血小板数:75,000/mm <sup>3</sup> 未満 骨髄機能が回復するまでは投与延期 (JACCRO GC-07試験 におけるコース開始前の投与基準に準拠)
副作用	<p>●タキソテール</p> <p><b>重大</b> 1.骨髄抑制 2.ショック症状、アナフィラキシー 3.黄疸、肝不全、肝機能障害 4.急性腎障害 5.間質性肺炎、肺線維症 6.心不全 7.播種性血管内凝固症候群(DIC) 8.腸管穿孔、胃腸出血、虚血性大腸炎、大腸炎 9.イレウス 10.急性呼吸促進症候群 11.急性膵炎 12.皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死症、多形紅斑 13.心タンポナーデ、肺水腫、浮腫・体液貯留 14.心筋梗塞、静脈血栓症 15.感染症 16.抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)</p> <p><b>その他</b> (50%以上)食欲不振、脱毛、全身倦怠感 (5~50%未満)悪心・嘔吐、下痢、口内炎、しびれ感、AST(GOT)・ALT(GPT)・AI-P・LDH上昇、発熱、浮腫、 総蛋白・アルブミン異常 (5%未満、頻度不明)添付文書参照</p> <p>●TS-1</p> <p><b>重大</b> 1.骨髄抑制、溶血性貧血 2.播種性血管内凝固症候群(DIC) 3.劇症肝炎等の重篤な肝障害 4.脱水症状 5.重篤な腸炎 6.間質性肺炎 7.心筋梗塞、狭心症、不整脈、心不全 8.重篤な口内炎、消化管潰瘍、消化管出血、消化管穿孔 9.急性腎障害、ネフローゼ症候群 10.中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群 11.白質脳症等を含む精神神経障害 12.急性膵炎 13.横紋筋融解症 14.嗅覚脱失 15.涙道閉塞</p> <p><b>その他</b> (5%以上)白血球減少、好中球減少、血小板減少、赤血球減少、ヘモグロビン減少、ヘマトクリット値減少、リンパ球減少、 AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、ビリルビン上昇、AI-P上昇、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、味覚異常、 色素沈着、発疹、全身倦怠感、LDH上昇、総蛋白減少、アルブミン低下</p>
備考	8コース目から12コース目まではTS-1単独として4週服用2週休薬で投与すること

# タキソテール+TS-1併用療法 観察記録

所要時間:2時間

氏名: ID( ) 年齢: ( 才)

施行日	クール	回目	施行前内服薬( )	入外( )	
医師	<b>指示医師:</b> <b>タキソテール(                    mg )</b> 一般名(ドセタキセル) <b>TS-1 (                    mg )</b> 一般名(テガフル・ギメラシル・オテラシル)		<b>抗癌剤用量</b> 計画書設定量 計画書設定量より減量 計画書設定量より増量 減量・増量理由	抗がん剤以外の 薬剤の変更・追加	
	<input type="checkbox"/> 投与決定 <input type="checkbox"/> 未決定 <input type="checkbox"/> 延期・中止			投与 開始時間	調剤
投与指示	本体	側管			
	生食250mL		2時間かけて点滴 【125mL/h】		
		生食100mL +ラモセトロン1A +デカドロン 2 A	30分かけて点滴 【200mL/h】		
		5%ブドウ糖250mL +タキソテール	60分かけて点滴 【 250 mL/h】		
本体終了後抜去					