

化学療法計画書

ID					
氏名					
生年月日					
実施部署			発行日		
身長 (cm)	160	体重 (kg)	50	体表面積 (m ²)	1.50

指示医師:			
指導医師:			
投与開始予定日:	年	月	日
投与終了日:	年	月	日

病名	大腸癌
治療法	ベクティビックス+カンプト併用療法

	1	2
抗癌剤・商品名	ベクティビックス	カンプト
規格	100mg/5mL 400mg/20mL	40mg/2mL 100mg/5mL
一般名	パニツムマブ	イリノテカン
一日投与量(規定)	6mg/kg	150mg/m ²
患者情報から算出した一日投与量	300 mg	225.17 mg
実際の投与量	300 mg	220 mg
	199.9 mg/kg	146.6 mg/m²
投与日	day1	
1クール期間	14日間	
予定クール数		
検査スケジュール	原則的に投与日に化学療法施行前セット検査データに応じて臨時に検査実施	

適応基準	KRAS野生型の切除不能な進行・再発大腸癌
推奨経口剤	○このレジメンは中等度催吐性リスク群です。 ※5HT3受容体拮抗薬+点滴デカドロン(点滴レジメン組込み)以外に以下の経口制吐剤を推奨します。 デカドロン: day2、3、4: 8mg/日 イモンド: day1(抗癌剤投与前) 125mg、day2・day3 80mg/日はオプションとして使用可。ただし、デカドロン投与量を半減すること。
禁忌	1. 骨髄機能抑制のある患者 2. 感染症を合併している患者 3. 下痢(水様便)のある患者 4. 腸管麻痺、腸閉塞のある患者 5. 間質性肺炎又は肺線維症の患者 6. 多量の腹水、胸水のある患者 7. 黄疸のある患者 8. アタザナビル硫酸塩を投与中の患者 9. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
中止基準	投与前の好中球数: 1000/mm ³ 未満、血小板数: 50,000/mm ³ 未満 骨髄機能が回復するまでは投与延期 (CTCAE ver4.0 における Grade3 の血液毒性に準拠)
副作用	●ベクティビックス 重大 1. 重度の皮膚障害 2. 間質性肺疾患 3. 重度のInfusion reaction 4. 重度の下痢 5. 低マグネシウム血症 6. 中毒性表皮壊死融解症(TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群) その他 (10%以上) 口内炎、ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹 (0.5%以上10%未満) 味覚異常、下痢、悪心、嘔吐、口唇炎、便秘、掻痒症、皮膚炎、皮膚亀裂、紅斑、皮膚剥脱、爪の障害、手掌・足底発赤知覚不全症候群、湿疹、多毛症、結膜炎、血小板減少症、白血球減少症、低カルシウム血症、食欲減退、低カリウム血症、高カリウム血症、疲労、倦怠感、注入に伴う反応、発熱 ●カンプト 重大 1. 骨髄機能抑制 2. 高度な下痢、腸炎 3. 腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞 4. 間質性肺炎 5. ショック、アナフィラキシー 6. 肝機能障害、黄疸 7. 急性腎障害 8. 血栓塞栓症 9. 脳梗塞 10. 心筋梗塞、狭心症発作 11. 心室性期外収縮 その他 (50%以上) 悪心・嘔吐、食欲不振 (5~50%未満) 腹痛、脱毛 (5%未満) 食道炎、吐血、腸管運動亢進、しゃっくり、腹部膨満感、口内炎、口唇炎、痔核、胃腸音異常、AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、ALP上昇、ビリルビン上昇、LDH上昇、γ-GTP上昇、腎機能障害、クレアチニンクリアランス低下、電解質異常、蛋白尿、血尿、尿沈渣異常、呼吸困難、PaO ₂ 低下、気管支炎、上気道炎、咽頭炎、鼻炎、発声障害、咽頭知覚不全、口腔咽頭不快感、発疹、そう痒感、色素沈着、浮腫、発赤、紅斑、手足症候群、ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、しびれ等の末梢神経障害、頭痛、めまい、精神症状、意識障害、傾眠、興奮・不安感、不穏、頻脈、心電図異常、血圧低下、動悸、倦怠感、発熱、熱感、発汗、顔面潮紅、疼痛、腰痛、腹水、鼻汁、好酸球増加、総蛋白減少、アルブミン減少、カルシウム異常、尿酸異常、尿ウロビリノーゲン異常、糖尿、
備考	

ベクティビックス+カンプト併用療法 観察記録

所要時間:3時間半

氏名: ID() 年齢: (才)

施行日		クール	回目	施行前内服薬()	入外()
医師	指示医師:	抗癌剤用量 計画書設定量 計画書設定量より減量 計画書設定量より増量 減量・増量理由			抗がん剤以外の薬剤の変更・追加
	ベクティビックス (mg) 一般名(パニツムマブ) カンプト (mg) 一般名(イリノテカン)				
<input type="checkbox"/> 投与決定 <input type="checkbox"/> 未決定 <input type="checkbox"/> 延期・中止		投与開始時間	調剤	実施	
投与指示	本体	側管			
	生食250mL		3時間30分かけて点滴【70mL/h】		
	生食100mL+ベクティビックス		60分かけて点滴【100 mL/h】		
	生食100mL +アロキシ1V +デカドロン 3 A +ブスコパン(20mg) 0 A +硫酸アトピン(0.5mg) 0 A		30分かけて点滴【200mL/h】		
	5%ブドウ糖250mL+カンプト		90分かけて点滴【170 mL/h】		
本体終了後除去					