

# 化学療法計画書

ID					
氏名					
生年月日					
実施部署			発行日		
身長 (cm)	160	体重 (kg)	50	体表面積 (m <sup>2</sup> )	1.50

指示医師:			
指導医師:			
投与開始予定日:	年	月	日
投与終了日:	年	月	日

病名	乳癌
治療法	ハーセプチン+パージェタ併用維持療法

	1	2
抗癌剤・商品名	ハーセプチン	パージェタ
規格	60mg 150mg	420mg/14mL
一般名	トラスツズマブ	ペルツズマブ
一日投与量(規定)	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	840mg/回(初回) 420mg/回(2回目以降)
患者情報から算出した一日投与量	<b>初回 400 mg</b> <b>2回目以降 300 mg</b>	<b>初回 840 mg</b> <b>2回目以降 420 mg</b>
実際の投与量	<b>300 mg</b>	<b>420 mg</b>
	<b>6 mg/kg</b>	
投与日	day1	
1クール期間	21日間	
予定クール数		
検査スケジュール	原則的に投与日に化学療法施行前セット検査データに応じて随時検査実施	

適応基準	HER2陽性の手術不能または再発乳がん
推奨経口剤	○このレジメンは最小度催吐性リスク群です。静注、経口問わず制吐剤は不要です。
禁忌	1.本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 2.妊婦又は妊娠している可能性のある婦人
中止基準	投与前の好中球数:1000/mm <sup>3</sup> 未満、血小板数:50,000/mm <sup>3</sup> 未満 骨髓機能が回復するまでは投与延期 (CTCAE ver.4.0 における Grade3 の血液毒性に準拠)
副作用	<p>●ハーセプチン</p> <p><b>重大</b> 1.心障害(心不全、心原性ショック、肺浮腫、心嚢液貯留、心筋症、心膜炎、不整脈、除脈等:頻度不明) 2.アナフィラキシー様症状(頻度不明) 3.間質性肺炎・肺障害(頻度不明) 4.白血球減少、好中球減少、血小板減少、貧血(以上頻度不明) 5.肝不全、黄疸、肝炎、肝障害(以上頻度不明) 6.腎障害(頻度不明) 7.昏睡、脳血管障害、脳浮腫(以上頻度不明) 8.敗血症(頻度不明)</p> <p><b>その他</b> 1.発熱・悪寒(ともに27.7%) 2.無力症(19.8%) 3.悪心(19.4%) 4.疼痛(12.7%)</p> <p>●パージェタ</p> <p><b>重大</b> 1.好中球減少症(50.9%)、白血球減少症(16.7%) 2.infusion reaction(8.8%) 3.アナフィラキシー(1.0%)、過敏症(9.3%) 4.間質性肺疾患(0.5%)</p> <p><b>その他</b> 下痢(58.0%)、脱毛症(57.0%)、倦怠感(52.1%)、悪心(36.6%)、爪の異常(35.6%)、ニューロパチー(31.0%)、発疹(30.7%)</p>
備考	● 投与開始前に心エコーなどでLVEFを測定すること→50%未満の際は投与について再度検討すること

# ハーセプチン+パージェタ併用維持療法 観察記録

所要時間: 初回3時間 2回目以降90分

氏名: ID( ) 年齢: ( 才)

施行日		クール	回目	施行前内服薬( )	入外( )		
医師	指示医師:	<b>ハーセプチン</b> ( mg ) 一般名(トラスツズマブ) <b>パージェタ</b> ( mg ) 一般名(ペルツズマブ)			<b>抗癌剤用量</b> 計画書設定量 計画書設定量より減量 計画書設定量より増量 減量・増量理由	抗がん剤以外の薬剤の変更・追加	
	<input type="checkbox"/> 投与決定 <input type="checkbox"/> 未決定 <input type="checkbox"/> 延期・中止					投与開始時間 調剤 実施	
投与指示	本体	側管					
	生食250mL	※infusion reaction出現時の前投薬指示は枠外参照		<input type="checkbox"/> 初回 3時間かけて点滴【83mL/hr】 <input type="checkbox"/> 2回目以降 90分かけて点滴【167mL/hr】			
	生食250mL+パージェタ				<input type="checkbox"/> 初回 60分かけて点滴【250mL/hr】 <input type="checkbox"/> 2回目以降 30分かけて点滴【500mL/hr】		
	本体を流しながら経過観察				30分		
	生食250mL+ハーセプチン				<input type="checkbox"/> 初回 90分かけて点滴【167mL/hr】 <input type="checkbox"/> 2回目以降 30分かけて点滴【500mL/hr】		
本体終了後除去							
バイタル	項目	投与前	パージェタ投与中	ハーセプチン投与中	投与後	サイン	
	体温						
	脈拍						
	血圧	/	/	/	/		
	SpO <sub>2</sub>						
観察	呼吸困難					サイン	
	紅斑・発疹						
	悪寒						
	疼痛						
	嘔気						
	嘔吐					サイン	

アクシデント  
(過敏反応、不整脈、血管外漏出等)