

# 化学療法計画書

□部分に入力の上、薬局までご連絡下さい

ID
氏名
生年月日
実施部署
発行日

指示医師:
指導医師:
投与開始予定日: 年 月 日
投与終了日: 年 月 日

身長 (cm)	160	体重 (kg)	50	体表面積 (m <sup>2</sup> )	1.50
---------	-----	---------	----	------------------------	------

病名	前立腺癌
治療法	タキソテール・プレドニゾン併用療法

添付溶解液にアルコールを含有しているため、アルコール禁の患者の場合は溶解液を生食または5%ブドウ糖へ変更してください。

	1	2
抗癌剤・商品名	タキソテール	プレドニゾン錠
規格	20mg/0.5ml 80mg/2ml	1mg 5mg
一般名	ドセタキセル水和物	プレドニゾン
一日投与量(規定)	70mg/m <sup>2</sup>	10mg/day (分2)
患者情報から算出した一日投与量	105.08 mg	
実際の投与量	100 mg 66.62 mg/m <sup>2</sup>	
投与日	day1	連日(休業なし)
1クール期間	3週間	
予定クール数		
検査スケジュール	原則的に投与前、day8にS3、血算 検査データに応じて臨時に検査実施	

推奨 経口剤	このレジメンは軽度催吐性リスク群です。経ロデカドロンは推奨されません。
適応基準	前立腺癌
禁忌	1. 重篤な骨髄抑制のある患者 2. 感染症を合併している患者 3. 発熱を有し感染症の疑われる患者 4. 本剤又はポリソルベート80含有製剤に対し重篤な過敏症の既往歴のある患者 5. 妊婦又は妊娠している可能性のある患者
原則禁忌 (プレドニゾン)	1. 有効な抗菌剤の存在しない感染症、全身の真菌症の患者 2. 消化性潰瘍の患者 3. 精神病の患者 4. 結核性疾患の患者 5. 単純疱疹性角膜炎の患者 6. 後の白内障の患者 7. 緑内障の患者 8. 高血圧症の患者 9. 電解質異常のある患者 10. 血栓症の患者 11. 最近行った内臓の手術創のある患者 12. 急性心筋梗塞を起こした患者
中止基準	白血球数3000mm <sup>3</sup> 未満, 好中球数1500mm <sup>3</sup> 未満, 血小板数7×10 <sup>4</sup> /mm <sup>3</sup> 未満
副作用	<p>●タキソテール</p> <p><b>重大</b> 1. 骨髄抑制(汎血球減少、白血球減少、好中球減少(発熱性好中球減少を含む)、ヘモグロビン減少、血小板減少) 2. ショック症状・アナフィラキシー様反応 3. 黄疸、肝不全、肝機能障害 4. 急性腎不全 5. 間質性肺炎、肺線維症 6. 心不全 7. 播種性血管内凝固症候群(DIC) 8. 腸管穿孔、胃腸出血、虚血性大腸炎、大腸炎 9. イレウス 10. 急性呼吸促進症候群 11. 急性膀胱炎 12. 皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊死症(Lyell症候群)、多形紅斑 13. 心タンポナーデ、肺水腫、浮腫・体液貯留 14. 心筋梗塞、静脈血栓塞栓症 15. 感染症 16. 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群</p> <p><b>その他</b> 脱毛(77%)、食欲不振(60%)、全身倦怠感(54%)、悪心・嘔吐(48%)、発熱(46%)、下痢(23%)</p> <p>●プレドニゾン</p> <p><b>重大</b> 1. 誘発感染症、感染症の増悪 2. 続発性副腎皮質機能不全、糖尿病 3. 消化管潰瘍、消化管穿孔、消化管出血 4. 肺炎</p> <p>5. 精神変調、うつ状態、痙攣 6. 骨粗鬆症、大腿骨及び上腕骨等の骨頭無菌性壊死、ミオパシー 7. 緑内障、後囊白内障、中心性漿液性網脈絡膜症、多発性後極部網膜色素上皮症 8. 血栓症 9. 心筋梗塞、脳梗塞、動脈瘤 10. 硬膜外脂肪腫 11. 腱断裂</p> <p><b>その他</b> 過敏症、月経異常、クッシング症候群様症状等、消化器症状、呼吸器、縦隔気腫、精神神経系、筋・骨格系、脂質・蛋白質代謝系(満月様顔貌、野牛肩、窒素負平衡、脂肪肝等)、網膜障害、眼球突出等、血液系(白血球増多)、体液・電解質系(浮腫、血圧上昇、低カリウム性アルカローシス等)、ざ瘡、多毛、脱毛、色素沈着、皮下溢血、紫斑、線条、そう痒、発汗異常、顔面紅斑、脂肪織炎等、発熱、疲労感、ステロイド腎症、体重増加、精子数及びその運動性の増減、尿路結石、創傷治癒障害、皮膚・結合組織の菲薄化・脆弱化</p>

# タキソテール+ブレドニゾロン併用療法療法 観察記録

所要時間:2時間

氏名: ID( ) 年齢: ( 才)

施行日	クール	回目	施行前内服薬( )	入外( )
医師	<b>指示医師:</b> <b>タキソテール(                    mg )</b> 一般名(ドセタキセル)		<b>抗癌剤用量</b> 計画書設定量 計画書設定量より減量 計画書設定量より増量 減量・増量理由	抗がん剤以外の 薬剤の変更・追加
	<input type="checkbox"/> 投与決定 <input type="checkbox"/> 未決定 <input type="checkbox"/> 延期・中止			投与 開始時間
投与指示	本体	側管		
	5%ブドウ糖250mL		2時間30分かけて点滴 【100mL/h】	
	生食100mL +ラモセトロン1A +デカドロン 2 A		30分かけて点滴 【200mL/h】	
	5%ブドウ糖250mL +タキソテール		1時間30分かけて点滴【 167 mL/h】	
本体終了後抜去				