

# 化学療法計画書

ID					
氏名					
生年月日					
実施部署			発行日		
身長 (cm)	160	体重 (kg)	50	体表面積 (m <sup>2</sup> )	1.50

指示医師:			
指導医師:			
投与開始予定日:	年	月	日
投与終了日:	年	月	日

病名	前立腺癌
治療法	ジェブタナ単独療法

	1	2
抗癌剤・商品名	ジェブタナ	プレドニゾロン
規格	60mg	1mg錠 5mg錠
一般名	カバジタキセル	プレドニゾロン
一日投与量(規定)	25mg/m <sup>2</sup>	10mg/day
患者情報から算出した一日投与量	<b>37.53 mg</b>	<b>10 mg</b>
実際の投与量	<b>37 mg</b>	<b>mg</b>
	<b>24.6 mg/m<sup>2</sup></b>	
投与日	day1	day1-21
1クール期間	21日間	
予定クール数		
検査スケジュール	原則的に投与日に化学療法施行前セット 検査データに応じて随時検査実施	

適応基準	外科的あるいは内科的去勢術後に進行再発となった前立腺癌
推奨経口剤	○このレジメンは軽度催吐性リスク群です。推奨される経口制吐剤はありません。
禁忌	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重篤な骨髄抑制のある患者</li> <li>2. 感染症を合併している患者</li> <li>3. 発熱を有し、感染症の疑われる患者</li> <li>4. 肝機能障害を有する患者</li> <li>5. 本剤又はポリソルベート80含有製剤に対し重篤な過敏症の既往歴のある患者</li> <li>6. デスマプレシン酢酸塩水和物(男性における夜間多尿による夜間頻尿)を投与中の患者</li> </ol>
中止基準	投与前の好中球数: 1000/mm <sup>3</sup> 未満、血小板数: 50,000/mm <sup>3</sup> 未満 骨髄機能が回復するまでは投与延期 (CTCAE ver4.0 における Grade3 の血液毒性に準拠)
副作用	<p>●ジェブタナ</p> <p><b>重大</b> 1. 骨髄抑制 2. 腎不全 3. 消化管出血、消化管穿孔、イレウス、重篤な腸炎 4. 重篤な下痢 5. 感染症 6. 不整脈 7. 心不全 8. アナフィラキシーショック 9. 末梢神経障害 10. 肝不全、肝機能障害 11. 播種性血管内凝固症候群(DIC) 12. 急性膵炎 13. 皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群) 14. 心タンポナーデ、浮腫、体液貯留 15. 心筋梗塞、静脈血栓塞栓症 16. 間質性肺疾患 17. 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH) 18. 重篤な口内炎等の粘膜炎 19. 血管炎</p> <p><b>その他</b> (20%以上) 悪心、疲労 (5~20%未満) 食欲減退、味覚異常、嘔吐、便秘、脱毛症、無力症 (1~5%未満) 過敏症、脱水、不眠症、浮動性めまい、錯感覚、頭痛、嗜眠、感覚鈍麻、流涙増加、低血圧、潮紅、起立性低血圧、呼吸困難、咳嗽、腹痛、消化不良、上腹部痛、口内炎、胃食道逆流性疾患、口内乾燥、腹部膨満、歯周病、皮膚乾燥、爪の障害、発疹、紅斑、筋痙攣、四肢痛、筋力低下、関節痛、筋肉痛、血尿、排尿困難、膜の炎症、発熱、倦怠感、インフルエンザ様疾患、体重減少、AST上昇、ALT上昇</p> <p>●プレドニゾロン</p> <p><b>重大</b> 1. 誘発感染症、感染症の増悪 2. 続発性副腎皮質機能不全、糖尿病 3. 消化管潰瘍、消化管穿孔、消化管出血 4. 膵炎 5. 精神変調、うつ状態、痙攣 6. 骨粗鬆症、大腿骨及び上腕骨等の骨頭無菌性壊死、ミオパチー 7. 緑内障、後嚢白内障、中心性漿液性網脈絡膜症、多発性後極部網膜色素上皮症 8. 血栓症 9. 心筋梗塞、脳梗塞、動脈瘤 10. 硬膜外脂肪腫 11. 腱断裂</p> <p><b>その他</b> 添付文書参照</p>
備考	

# ジェブタナ単独療法 観察記録

所要時間: 2時間

氏名: ID( ) 年齢: ( 才)

施行日		クール	回目	施行前内服薬( )	入外( )	
医師	指示医師:	<b>ジェブタナ</b> (            mg ) 一般名(カバジタキセル) ※アルコールアレルギーを有する患者への 投与時には慎重にモニタリングすること			<b>抗癌剤用量</b> 計画書設定量 計画書設定量より減量 計画書設定量より増量 減量・増量理由	抗がん剤以外の 薬剤の変更・追加
	<input type="checkbox"/> 投与決定 <input type="checkbox"/> 未決定 <input type="checkbox"/> 延期・中止					
投与 指示	本体	側管				
	生食250mL		2時間かけて点滴【125mL/h】			
	生食100mL なし +デカドロン 2 A +ポララミン1A +ファモチジン1A		30分かけて点滴【200mL/h】			
	生食250mL+ジェブタナ		60分かけて点滴【 250 mL/h】 <b>フィルター付き点滴ラインで投与</b>			
本体終了後抜去						